

Bloker Premix

Nombre Comercial

Bloker Premix

Descripción del Producto:

Carminativo, en base a Tensioactivos no iónicos, para incorporar a la ración.

Composición:

Polietilenglicol (C12-13) alquile ter.....20 g
Alcohol láurico polioxietilénico.....5 g
Excipientes c.s.p.....100 g

Indicación:

está indicado como ayuda en la prevención y el tratamiento del timpanismo espumoso (empaste) del bovino, producido por el pastoreo de leguminosas (alfalfa, tréboles, etc.) Protege a los animales tratados por 24 hs. Puede administrarse sin contraindicaciones, tanto en vacas lecheras en producción como en ganado de carne. No deja residuos en la leche ni en la carne de los animales tratados.

Dosis:

8 g de Bloker Premix cada 100 kg de peso. Ej.: para un animal de 300 kg suministrar 24 g de Bloker Premix por animal por día.

Modo de empleo:

Para ser incorporado en las raciones o sales a razón de 8 g cada 100 kg de peso por animal por día. Para calcular la incorporación de Bloker Premix por tonelada de ración o suplemento se puede aplicar la siguiente fórmula:

Kg de Bloker premix x tonelada de ración:

Dosis diaria (g) % consumo diario de ración (kg)

Ej.: 24 g % 5 kg = 4,8 kg/t

- 1) Comenzar la administración 2 o 3 días antes de poner a los animales en pasturas empastadoras.
- 2) La efectividad antiespumante de Bloker Premix depende de su concentración en el rumen. En caso de manifestación de timpanismo a la dosis recomendada, incremente la misma o revise el sistema de aplicación.
- 3) Para incrementar los niveles de seguridad se puede dar la dosis diaria de Bloker Premix repartido en más de un sistema de aplicación. Ejemplo: ½ dosis en la ración o sales complementando con ½ dosis de Bloker Ultra en el agua de bebida o rociando pasturas.
- 4) En situaciones de alta incidencia de empaste apoye la medicación con un manejo adecuado. Es muy útil la combinación de Bloker Premix con medicamentos de diferente mecanismo de acción como el Rumigan, a una

dosis orientativa de monensina de 70 mg/100 kg/día.

Precauciones de uso:

Es un producto irritante moderado para los ojos y mucosas. En caso de contacto con piel o mucosas lavar con abundante agua. En caso de inhalación aplicar tratamiento sintomático. En caso de ingestión administrar agua o leche para beber. No inducir el vómito. Llamar al médico. Corresponde aplicar tratamiento sintomático.

Almacenamiento:

Conservar entre 15°C y 25°C.

Período de vida útil:

2 años.

Presentación:

Bolsa de 20 kg

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION TM

HEALTHY ANIMALS.
HEALTHY FOOD.
HEALTHY WORLD.®