

Bloker 25 Plus

Nombre Comercial

Bloker 25 Plus

Indicaciones:

Está indicado como ayuda en la prevención y tratamiento del timpanismo espumoso (empaste) del bovino, producido por el pastoreo de leguminosas (alfalfa, tréboles, etc.) Protege a los animales tratados por 24 hs. Puede administrarse sin contraindicaciones, tanto en vacas lecheras en producción como en ganado de carne. No deja residuos en la leche ni en la carne de los animales tratados.

Forma farmacéutica:

Solución oral

Composición:

Polietilenglicol (C12-13) alquile ter	20 g
Alcohol láurico polioxietilénico	5 g
Excipientes c.s.p.	100 g

Dosificación: 8 ml de Bloker 25 Plus cada 100 kg de peso. Ej.: para un animal de 300 kg administrar 24 ml de Bloker 25 Plus por animal por día. En caso necesario, esta dosis puede incrementarse hasta controlar el empaste.

Modo de empleo:

Puede usarse en el agua de bebida o mediante rociado de pasturas empastadoras. En el agua de bebida: administrar con dosificador o simplemente incorporar la cantidad necesaria para que cada bovino, por ejemplo, de 300 kg, que consume entre 30 y 40 L de agua, reciba 24 ml de Bloker 25 Plus.

Aplicación sobre pasturas:

para el rociado de pasturas, debe calcularse la superficie que consumirá el grupo de animales en 24 hs. Ej.: una parcela de 1 ha puede alimentar 100 bovinos de 300 kg durante 24 hs.

Cálculo: N° de Cabezas x 24 ml : 100 animales x 24 ml : 2,4 L/ha
Superficie en ha. X día 1 ha

Puede diluirse en 100 a 250 litros de agua, rociando a 30-40 libras/pulgada² con gota chica cubriendo la pastura. La aplicación puede hacerse 2 a 3 días antes, ya que no se degrada por el sol o el ambiente. En caso de lluvia debe aplicarse nuevamente porque se lava el activo. El producto diluido debe consumirse dentro de los 30 días de realizada la dilución.

1)Comenzar la administración 2 o 3 días antes de poner a los animales en pasturas empastadoras.

2)La efectividad antiespumante de Bloker 25 Plus depende de su concentración en el rumen. En caso de manifestación de timpanismo a la dosis recomendada, incremente la misma o revise el sistema de aplicación.

3)Se ha comprobado experimentalmente que, en casos de animales con riesgo de muerte por empaste, se puede administrar oralmente una dosis curativa de hasta 4-5 veces la dosis recomendada.

4)Para incrementar los niveles de seguridad se puede dar la dosis diaria de Bloker 25 Plus repartido en más de un sistema de aplicación. Ejemplo: ½ dosis en la ración o sales complementando de Bloker Premix con ½ dosis de Bloker 25 Plus en el agua de bebida o rociando pasturas.

5)En situaciones de alta incidencia de empaste apoye la medicación con un manejo adecuado. Es muy útil la combinación de Bloker 25 Plus con medicamentos de diferente mecanismo de acción como el Rumigan, a una dosis orientativa de monensina de 70 mg/100 kg/día.

Precauciones: En caso de ingestión, dar agua o leche para beber. No inducir el vómito. Si hubo contacto con ojos o mucosas, lavar con abundante agua. En caso de inhalación, retirar a la persona expuesta al aire libre. Si hubo derrame, absorber con arena o aserrín y lavar la zona con agua caliente limpia.

Almacenamiento:

Consérvese entre 15°C y 25°C.

Vida útil:

2 años.

Presentación:

Baldes 20 litros.

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION TM

HEALTHY ANIMALS.
HEALTHY FOOD.
HEALTHY WORLD.®

Phibro Animal Health de Argentina S.R.L.
Rutherford 4503 - Grand Bourg (B1615GYC)-Pcia. Bs. As.
Tel./Fax: (03327) 44-4567
info.phibroarg@pahc.com
www.phibrosaludanimal.com
ARG - FEB2022