

MB-1

Vacuna liofilizada a virus vivo atenuado intermedio de la Enfermedad de Bursitis Infecciosa (Gumboro) Cepa MB para pollos de un día de edad o huevos embrionados de 18 días

Nombre Comercial

MB-1

Descripción:

Esta vacuna es de un virus vivo atenuado de la Enfermedad Infecciosa de la Bolsa, la cual está liofilizada en el contenedor final y sellada al vacío. La vacuna está elaborada en tejidos y fluidos de huevos embrionados de pollo obtenidos de parvadas libres de patógenos específicos (SPF). La cepa M.B. es una variedad "Intermedia" estable en su nivel de virulencia.

Indicaciones:

Para aplicar en pollos al día de edad o huevos embrionados de 18 días de incubación para proveer protección temprana a los pollos de engorda, reproductoras y ponedoras reduciendo la morbilidad y la mortalidad asociada con la infección causada por el IBDV.

La liberación del virus de la vacuna está influenciada por la presencia de los anticuerpos maternos (MDA). La vacuna es eficaz en la presencia de un amplio espectro de títulos de MDA. A más altos niveles de MDA en el día de vacunación, más tarde le MB-1 se liberará de los MDA y el inicio de la inmunidad será retrasada.

Métodos de Administración:

Reconstituya la vacuna con el diluyente de Solución de Lactato de Sodio.

Use dispositivos y equipo estériles para la reconstitución y para la administración de la vacuna. Siga el manual de instrucciones del usuario para las jeringas automáticas y equipo.

Tome especial cuidado para evitar la contaminación de la vacuna y el equipo durante la administración. Siempre use agujas y tubos estériles nuevos.

1. No vacune a las parvadas con anticuerpos maternos menores a 2500 (promedio de la parvada, IDEXX-ELISA)
 2. Las aves a ser vacunadas deben estar en buena salud.
 3. Las vacunas vivas son sensibles a la luz solar, calor, desinfectantes y detergentes, así que no debe ser expuesta a estos.
 4. Asegure una dosificación apropiada. No use dosis bajas.
 5. No use viales dañados.
 6. Los viales abiertos y la vacuna reconstituida deben usarse de inmediato. No guarde la porción no usada de la vacuna para usarla otro día.
 7. Para controlar la diseminación del virus, los dispositivos de inyección de la vacuna y las instalaciones de la incubadora deben ser descontaminadas después de la vacunación.
 8. Los pollos de huevos vacunados no deben ser mezclados con los pollos de huevos no vacunados. Las casetas para aves deben ser descontaminadas entre lotes de pollos.
- En caso de accidente llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Almacenamiento:

Mantenga en refrigeración entre +2°C y +8°C.

Los viales abiertos y la vacuna en su suspensión final deben ser usados inmediatamente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación:

Caja con 10 viales sellados al vacío que contienen el virus de Gumboro, cepa M.B., en forma liofilizada. Cada vial puede contener: 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 5000, 9000, 10000, 12000 o 15000 dosis.

Para la suspensión se usa una Solución de Lactato de Sodio como diluyente.

Precauciones generales:

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION

HEALTHY ANIMALS.
HEALTHY FOOD.
HEALTHY WORLD.®