

V-MAX 2

NOMBRE COMERCIAL:

V-MAX 2

COMPOSICIÓN:

Virginiamina..... 2,00g
Excipientes c.s.p. 100,00g

INDICACIONES:

Control de la acidosis ruminal y metabólica en bovinos ingiriendo alimentos concentrados ricos en energía.
Reducción de la incidencia de los abscesos hepáticos, en bovinos en engorde a corral.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Control de la acidosis ruminal y metabólica en bovinos ingiriendo alimentos concentrados ricos en energía:

En condiciones de alimentación predominantemente en base a forrajes voluminosos: 10g de V-Max 2® por cabeza por día.

Para la reducción de la incidencia de los abscesos hepáticos en bovinos en engorde a corral:

660mg a 1,36g de V-Max 2® por kg de materia seca en el alimento.

IMPORTANTE:

El producto es estable en mezclas con raciones secas, sin embargo y a los efectos de evitar alteraciones de la ración por inadecuado almacenamiento se sugiere preparar la mezcla del producto con el alimento diariamente, y debe ser utilizado dentro de las 24 horas de preparado.

PRECAUCIONES:

Puede ocurrir irritación en ojos, piel, sistema respiratorio o reacción alérgica debido al contacto con el producto.

Si hubiera contacto accidental con los ojos o la piel, lavar con agua abundante.

En caso de ingesta accidental, consultar al médico.

No existe antídoto específico.

En caso necesario aplicar tratamiento sintomático.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta.

Teléfono del Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160

PERIODO DE RESTRICCIÓN:

No requiere periodo de retiro cuando se administra a las dosis indicadas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener en su envase original, cerrado, alejado del suelo, en lugar fresco, seco y ventilado, al resguardo de la luz solar directa, entre 15 y 25°C.

PRESENTACIÓN:

Bolsa de 25 kg

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION™

HEALTHY ANIMALS.
HEALTHY FOOD.
HEALTHY WORLD.®