

# Stafac 500<sup>®</sup>

(Virginamicina)

## Nombre Comercial

Stafac 500

## Composición/ Fórmula

Cada 100 gramos de Stafac 500 contiene

Virginamicina ..... 50 g  
Excipientes (c.s.p.) ..... 100 g

## Indicaciones:

Cerdos por encima de 50 kilos.

Para el tratamiento y ayuda en el control de la disentería porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae*.

Para Ayuda en el control de la disentería porcina en animales o en las instalaciones con una historia de la disentería porcina pero donde aún no se han producido síntomas.

Cerdos por debajo de 50 kilos.

Para el tratamiento y control de la disentería porcina en cerdos de hasta 50 kilos.

Pollos (de engorde)

Para la prevención de la enteritis necrótica causada por *Clostridium perfringens* susceptibles a la virginamicina en pollos de engorde.

## Vía de administración:

Oral, mezclado en el alimento terminado.

Cerdos por encima de 50 kilos.

Para el tratamiento de la disentería porcina.

Para uso en cerdos no destinados a la reproducción proporcionar 100 g/tonelada de alimento por 2 semanas.

Cerdos de hasta 50 kg :

- Para el tratamiento y control de la disentería porcina proporcionar 25 gramos por tonelada de alimento.

- Para uso en animales en instalaciones con una historia de disentería porcina pero donde aún no se han producido síntomas proporcionar 10 gramos por tonelada de alimento desde el destete hasta 50 kilos.

Pollos (de engorde)

Para la prevención de la enteritis necrótica causada por *Clostridium perfringens* susceptibles a la virginamicina

en pollos de engorde proporcionar 20 gramos por tonelada de alimento.

No debe utilizarse en ponedoras.

## Advertencias:

Usar exclusivamente para las especies indicadas.

No hay contraindicaciones ni reacciones adversas.

No existen antídotos. En caso de hipersensibilidad, discontinuar el uso del producto.

Stafac no sufre degradación a las temperaturas normales de peletizado.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

## Período de Retiro:

Cero días. Virginamicina no es absorbido por los animales y su acción es exclusivamente en el aparato digestivo.

No deja residuos en la canal.

## Condiciones de almacenamiento:

Mantener en un lugar fresco y seco entre 15°C y 30°C.

Venta bajo receta veterinaria archivada.

## USO VETERINARIO

### Presentación:

Bolsa de 25 kg

**Phibro**  
ANIMAL HEALTH CORPORATION TM

PHIBRO ANIMAL HEALTH (URUGUAY) SRL  
Mariano Uriarte 6099 - Montevideo - Uruguay  
Dirección técnica: D.M.V Diego Cuadrado  
URU-MAY2022

HEALTHY ANIMALS.  
HEALTHY FOOD.  
HEALTHY WORLD.®