



Aviax[®] 5%

EFICACIA SUPERIOR Y SEGURIDAD CONTRA LA COCCIDIOSIS

- SEMDURAMICINA

- IONÓFORO GLUCÓSIDO

- ALTA EFICACIA ANTICOCIDIAL,
EN ESPECIAL, CONTRA
EIMERIA MAXIMA

HEALTHY ANIMALS. HEALTHY FOOD. HEALTHY WORLD.®

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION



Excelente eficacia anticoccidial

- *Eimeria maxima*
- *Eimeria tenella*
- *Eimeria acervulina*



Resultados comprobados con semduramicina

Un estudio finalizado en enero de 2023 demostró que 120 ppm de monensina afectaban significativamente el consumo de las aves desafiadas con coccidiosis en comparación con la semduramicina y la salinomicina.

Con resultados superiores de ganancia de peso, se ha demostrado que la semduramicina (ionóforo glucósido) es el ionóforo ideal para sustituir a la monensina (ionóforo monovalente) en los programas de rotación.

Gráfico 1: Consumo de alimento (kg)





Gráfico 2: Ganancia de peso (kg)



Las medias con letras diferentes son estadísticamente significativas por la prueba SNK (P<0,05)
NS: no significativo

Hacer una Rotación de impacto con Aviax® 5%

La rotación es una estrategia técnica para el uso de anticoccidiales. La rotación entre distintas clases (monovalente, glucósido y divalente) es esencial, en especial, en el caso de los ionóforos. Por este motivo, Phibro ha desarrollado la Rotación de impacto, una estrategia para mantener la eficacia de las moléculas anticoccidiales ionóforas del mercado.

	Pré-inicial	Inicial	Crecimiento 1*	Crecimiento 2	Final
Verano	Aviax® Plus Nicarbazina + Semduramicina	Aviax® Plus Nicarbazina + Semduramicina	Aviax® Plus Nicarbazina + Semduramicina	Aviax® 5% Semduramicina	Aviax® 5% Semduramicina
Invierno	Nicarmix® 25 Nicarbazina	Nicarmix® 25 Nicarbazina	Coxistac® 12% Salinomicina	Coxistac® 12% Salinomicina	Coxistac® 12% Salinomicina

*28 días de edad

Referencia:

Estudio interno de Phibro BRT 134-184.2023.