


Programas de Vacunación con Phivax® SLE

Protección contra Salmonella Enteritidis



**SEMANA 1:
PROTECCIÓN INICIAL**

La primera dosis de Phivax® SLE se administra en el tercer día de vida de las pollitas, una vez que se han regularizado el consumo de agua y alimento.


Esta primera vacunación es crucial para establecer una protección temprana contra *Salmonella* Enteritidis y es conocido que hay protección cruzada contra *S. Gallinarum* por estar ambas incluidas en el grupo antigénico O:9 (antes grupo D1).



Al proteger a las aves desde el inicio, se reduce la posibilidad de que *Salmonella* Enteritidis se establezca en el ambiente y en las aves, y la protección cruzada, ayuda a reducir el riesgo de exposición también a *S. Gallinarum*.

HEALTHY ANIMALS. HEALTHY FOOD. HEALTHY WORLD.®

Phibro
ANIMAL HEALTH CORPORATION



REFUERZO DE PROTECCIÓN: REVACUNACIÓN

La vacuna contra *Salmonella* Gallinarum (SG) se administra a la sexta semana de vida, y una revacunación entre la onceava y catorceava semana de vida de las pollitas como refuerzo específico contra este serovar de *Salmonella*.

El refuerzo con SG complementa la protección proporcionada por **Phivax® SLE** en forma temprana y fortalece la defensa contra *Salmonella* en la granja.

Al proteger a las pollitas contra *Salmonella* desde el primer día, se reduce significativamente la posibilidad de que se contamine el lote y se establece una base sólida para un programa de vacunación efectivo.

La vacunación complementaria con una vacuna viva de *S. Enteritidis* y una vacuna para *S. Gallinarum* refuerza la protección contra ambas cepas en la etapa inicial de desarrollo de las aves.



PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN

Para extender la duración de la protección, Phibro recomienda la aplicación de dos dosis de **Salmin Plus®**, una bacterina contra *Salmonella* formulada con dos serovares de *S. Enteritidis*, uno de *S. Typhimurium*, y uno de *S. Infantis*.

PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE VACUNACIÓN DE PHIBRO

POLLITAS DE POSTURA

Edad de vacunación	Vacuna	Ruta de aplicación
Primera semana	Phivax® SLE	Agua de bebida
6 semanas	SG vacuna viva	Subcutánea
9 semanas	Salmin Plus® 0.3mL	Subcutánea / IM
10-11 semanas	SG vacuna viva	Subcutánea
12 semanas	Salmin Plus® 0.3mL	Subcutánea / IM

POLLITAS REPRODUCTORAS

Edad de vacunación	Vacuna	Ruta de aplicación
Primera semana	Phivax® SLE	Agua de bebida
6 semanas	SG vacuna viva	Subcutánea
12-16 semanas	Salmin Plus® 0.3mL	Subcutánea / IM
13-14 semanas	SG vacuna viva	Subcutánea
16-20 semanas	Salmin Plus® 0.3mL	Subcutánea / IM

Referencias:

Ashash, Udi (2023). The development of the immune system in chickens and the mechanism of *Salmonella* maternal immunity. "Salmonella Summit" presentation. Sao Paulo, Brazil. Nov. 2023

Pulido-Landinez, Martha. (2023). A busca incessante por um programa eficaz de vacinação contra *Salmonella*: Alguem tem a quem tem a ultima palavra? . "Salmonella Summit" presentation. Sao Paulo, Brazil. Oct. 2023

Pulido-Landinez, Martha. (2021). The role of vaccination in a comprehensive *Salmonella* control plan. *Salmonella Control Booklet*. Phibro ref. MS530720INT ©2021

GV043624PR-SP ©PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION, PHIBRO, EL DISEÑO DEL LOGOTIPO PHIBRO, HEALTHY ANIMALS. HEALTHY FOOD. HEALTHY WORLD., PHIVAX® SLE Y SALMIN PLUS® SON MARCAS REGISTRADAS PROPIEDAD, O BAJO LICENSIA DE PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION O SUS AFILIADAS.